



Information des patients

À quoi sert EVKEEZA^{MD}?

EVKEEZA (évinacumab pour injection) est utilisé pour traiter les adultes et les enfants âgés de 6 mois et plus qui présentent des taux de cholestérol très élevés causés par une maladie appelée « hypercholestérolémie familiale homozygote » (HFHo). EVKEEZA est prescrit avec un régime alimentaire faible en matières grasses et d'autres médicaments afin d'abaisser les taux de cholestérol.

Veillez lire le dépliant d'information sur le médicament destiné aux patients pour de plus amples renseignements sur EVKEEZA. Utilisez le présent livret comme base de discussion avec votre professionnel de la santé. Il ne remplace pas une consultation avec cette personne relativement à votre état de santé ou votre traitement.



EVKEEZA est prescrit avec un régime alimentaire faible en matières grasses et d'autres médicaments afin d'abaisser les taux de cholestérol

Qu'est-ce que la HFHo?

La HFHo est héréditaire, généralement transmise à la fois par le père et par la mère. Les personnes atteintes de cette maladie présentent des taux de cholestérol-LDL (« mauvais cholestérol ») extrêmement élevés depuis la naissance.

Comment EVKEEZA agit-il?

L'évinacumab, substance active d'EVKEEZA, se fixe à une protéine présente dans l'organisme appelée « ANGPTL3 » et bloque ses effets. ANGPTL3 participe au contrôle des taux de cholestérol. Lorsque l'évinacumab bloque les effets d'ANGPTL3, le cholestérol-LDL sanguin diminue, et les problèmes causés par des taux élevés de cholestérol-LDL pourraient également diminuer.

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à EVKEEZA?

Voici certains des effets secondaires possibles que vous pourriez ressentir lorsque vous prenez EVKEEZA. Si vous ressentez des effets secondaires qui ne font pas partie de cette liste, avisez votre professionnel de la santé.

- Douleurs abdominales
- Démangeaisons au site de perfusion
- Dorsalgie
- Nausée
- Constipation
- Douleur dans les jambes ou les bras
- Diminution de l'énergie
- Écoulement nasal
- Sensation d'étourdissement
- Fatigue (chez les patients âgés de 5 à 11 ans)
- Symptômes grippaux
- Mal de gorge ou sinusite

Effets secondaires rares, mais graves :

Anaphylaxie (les symptômes peuvent inclure une tuméfaction principalement des lèvres, de la langue ou de la gorge compliquant la déglutition ou la respiration, une respiration sifflante, une sensation d'étourdissement ou un évanouissement). Si vous ressentez ces symptômes, cessez de prendre le médicament et obtenez une aide médicale sans délai.

En cas de symptôme ou d'effet secondaire gênant non mentionné dans le présent document ou d'aggravation d'un symptôme ou d'effet secondaire vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Surdose

Il est peu probable que vous receviez trop d'EVKEEZA, car des professionnels de la santé vous surveilleront de près pendant votre perfusion. Cependant, si vous pensez que vous, ou une personne dont vous vous occupez, avez pris trop d'EVKEEZA, contactez immédiatement un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou votre centre antipoison régional, même en l'absence de symptômes.

Renseignements d'innocuité importants

Ne prenez pas EVKEEZA si :

- Vous êtes allergique à l'évinacumab ou à l'un des autres composants de ce médicament.
 - Ingrédient médicinal : évinacumab.
 - Ingrédients non médicinaux : chlorhydrate de L-arginine, L-histidine, monochlorhydrate de L-histidine monohydratée, L-proline, polysorbate 80 et eau pour injection, USP.

Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre EVKEEZA, afin de réduire la possibilité d'effets secondaires et d'utiliser correctement le médicament. Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment :

- Si vous êtes enceinte, que vous pensez être enceinte ou que vous planifiez une grossesse, demandez conseil à votre professionnel de la santé avant de prendre EVKEEZA. EVKEEZA peut nuire à votre enfant à naître. Informez immédiatement votre professionnel de la santé si vous entamez une grossesse pendant votre traitement avec EVKEEZA.

Si vous êtes fertile :

- Votre professionnel de la santé peut vous faire passer un test de grossesse avant de commencer le traitement avec EVKEEZA.
- Vous devez utiliser une méthode contraceptive efficace pendant le traitement et pendant au moins les 5 mois qui suivent la dernière administration d'EVKEEZA. Discutez avec votre professionnel de la santé de la meilleure méthode de contraception pour vous pendant cette période.
- Si vous allaitez ou envisager d'allaiter, demandez conseil à votre professionnel de la santé avant de prendre EVKEEZA. On ne sait pas si EVKEEZA est excrété dans le lait maternel. Vous devrez décider avec votre professionnel de la santé si vous prendrez EVKEEZA ou que vous allaiterez.

Mentionnez à votre professionnel de la santé tous les médicaments que vous prenez, y compris les vitamines, minéraux, suppléments naturels ou médicaments alternatifs.

- Aucune étude visant à tester la façon dont EVKEEZA interagit avec d'autres médicaments n'a encore été menée.

Quelle est la dose habituelle?

La dose d'EVKEEZA est habituellement de 15 mg/kg de poids corporel, administrée par perfusion intraveineuse (i.v.) pendant 60 minutes toutes les 4 semaines.

Comment prendre EVKEEZA?

Votre professionnel de la santé vous administrera une perfusion d'EVKEEZA en goutte-à-goutte dans une veine (perfusion intraveineuse) pendant 60 minutes.

EVKEEZA devrait être administré toutes les 4 semaines. Si vous avez manqué un rendez-vous où vous deviez recevoir EVKEEZA, parlez-en à votre professionnel de la santé le plus tôt possible pour planifier un nouveau rendez-vous.

Votre professionnel de la santé peut ralentir, interrompre ou arrêter le débit de la perfusion d'EVKEEZA si vous ressentez certains effets secondaires.

Votre professionnel de la santé peut vous prescrire d'autres médicaments contre l'hypercholestérolémie à utiliser avec EVKEEZA. Prenez les autres médicaments exactement comme prescrit par votre professionnel de la santé.

Que faire si je manque une dose?

Si vous manquez une dose d'EVKEEZA, appelez votre professionnel de la santé dès que possible pour la planifier à nouveau.

Soutien aux patients

Nos gestionnaires de cas d'UltraCare^{MD} sont des professionnels d'expérience qui ont à cœur de vous soutenir à chaque étape. Ils peuvent vous aider à :



En savoir plus sur le traitement par EVKEEZA



Établir votre admissibilité à une aide financière



Comprendre votre couverture d'assurance

UltraCare^{MD}

Pour en savoir plus sur nos services aux patients :

Appelez au **1 833 388-5872 (U-LTRA)**

Télécopiez au **1 833 592-2273 (CARE)**





 **Evkeeza**^{MD}
évinacumab pour injection

EVKEEZA est utilisé pour traiter les adultes et les enfants âgés de 6 mois et plus qui présentent des taux de cholestérol très élevés causés par une maladie appelée « hypercholestérolémie familiale homozygote » (HFHo). EVKEEZA est prescrit avec un régime alimentaire faible en matières grasses et d'autres médicaments afin d'abaisser les taux de cholestérol.

Pour en savoir plus sur EVKEEZA :

- Parlez-en à votre professionnel de la santé.
- Consultez la monographie de produit complète; elle a été rédigée à l'intention des professionnels de la santé et renferme les renseignements sur le médicament pour les patients. Ce document est également disponible sur les sites Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html>) ou du fabricant (<https://www.ultragenyx.com/canadian-French/>), ou encore en appelant au 1 833 388-5872.

© Regeneron Pharmaceuticals, Inc. et Ultragenyx Pharmaceutical, Inc., 2025. Tous droits réservés.

MRCP-UX858-00101 09/2025

